

INSTRUCCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PRODUCTOS TRAVAD



Antes de iniciar la administración, lea cuidadosamente las instrucciones de uso.

TRAVAD ORAL X 133 mL



1 Refrigere el frasco de TRAVAD ORAL X 133 mL.



2 Diluya en 250 mL de agua o jugo de naranja.



3 Mezcle bien.



4 Ingiera el contenido en dos tomas, con un intervalo de 10 minutos.

TRAVAD ENEMA 133 mL



1 Retire el protector de la cánula rectal azul (a).



2 Acústese de medio lado e inserte la cánula (a) suavemente en el recto.



3 Rompa la válvula verde (b) flexionando hacia arriba y hacia abajo repetidas veces.



4 Oprima la bolsa con una mano hasta vaciar su contenido completamente.



5 Retire la cánula (a), retenga el líquido de 3 a 5 minutos y luego evacúe.

TRAVAD ENEMA 1000 mL



1 Cierre la llave corrediza de color blanco.



2 Retire el protector de la cánula rectal azul (a).



3 Acústese de medio lado e inserte la cánula (a) suavemente en el recto.



4 Rompa la válvula verde (b) flexionando hacia arriba y hacia abajo repetidas veces.



5 Abra la llave corrediza de color blanco para permitir el paso del líquido.



6 Apriete la bolsa con una mano o colóquela bajo su brazo hasta vaciar el contenido. La aplicación debe ser intermitente, cerrando y abriendo la llave corrediza de color blanco.



7 Retire la cánula (a), retenga el líquido de 10 a 15 minutos y luego evacúe.

TRAVAD ORAL, Reg. San. INVIMA N° 2010 M-015075 - R1, TRAVAD ENEMA DE FOSFATO Y BICLFVATO DE SODIO USP Reg. San. INVIMA N° 2008 M-000907 - R2, ENEMA DE SOLUCIÓN SALINA AL 2,5%, Reg. San. INVIMA N° 2006 M-000607 - R1, BOLSITA TRAVAD Reg. San. INVIMA N° 2010 DM-004746 - R1, Producto de Tecnogénicas S.A. Cali - Colombia.


Tecnogénicas